

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **MADEPULGA INSETICIDA PÓ**
- 2 - Forma Física: Sólido
- 3 - Categoria: Venda restrita para instituições e empresas especializadas
- 4 - Formulação: Pó Seco

Componentes	Concentração (% p/p)
Propoxur	1,00
Inertes	99,00
Total	100,00

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

Nome Comum: PROPOXUR

Registro CAS: 114-26-1

Fórmula Bruta: C₁₁H₁₅NO₃

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Polvilhe o produto diretamente da embalagem ou com auxílio de uma polvilhadeira. Aplique 14g de produto por m² (14g/m²) nas áreas infestadas por pulgas (cantos, rodapés, frestas em paredes e assoalhos, canil, etc.). Repita a aplicação 7 dias após a primeira aplicação.

5.1. Indicação de uso: Inseticida em pó para controle de pulgas (*Ctenocephalides sp.*) em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

6 - Embalagem: Caixa 1kg

7 - Precauções:

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- **INTERVALO DE TEMPO MÍNIMO PARA REENTRADA NOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DO PRODUTO: SEIS HORAS APÓS APLICAÇÃO;**
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Utilizar luvas para o manuseio do produto;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes.
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Metilcarbamato de fenila

Nome Comum: Propoxur

Antídoto e Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve. Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas. Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação.

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570007