FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **FIPROMIX GEL FORMICIDA**

2 - Forma Física: Sólido

3 - Categoria: Venda Livre

4 - Formulação: Gel

Componentes	Concentração (% - p/p)
Fipronil	0,05%
Inertes	99,95%
Total	100,00%

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

Nome Comum: Fipronil

Registro CAS: 120068-37-3

Fórmula Bruta: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

Atuação: Ingestão

5 - Modo de usar:

FIPROMIX® GEL FORMICIDA vem pronto para uso. Para aplicar pressione levemente o êmbolo da seringa, depositando filetes finos do produto nos locais onde há maior atividade das formigas.

- Locais de aplicação: indústrias alimentícias, cozinhas industriais, residências, restaurantes, panificadoras, frigoríficos, laticínios, fábricas de rações, ônibus, trens, escolas, hospitais, hotéis, supermercados, etc.

A definição dos pontos de aplicação deve ser feita após inspeção prévia do local, a fim de identificar os pontos com maior presença de formigas, tais como trilhas de forrageamento, pontos de acesso das formigas em estruturas

(batentes, molduras, espelhos de tomadas e/ou interruptores, móveis, eletrodomésticos, etc.), esconderijos e locais de passagem.

Em situações de alta infestação e/ou com várias trilhas de forrageamento deve-se aplicar vários filetes finos do gel, de modo que o maior número possível de formigas tenha acesso a isca.

A aplicação do gel em frestas, fendas, cantos e locais de difícil acesso favorece a permanência do gel no ambiente por mais tempo, reduzindo o risco de remoção acidental e/ou contaminação com outras substâncias.

5.1. Indicação de Uso:

O produto FIPROMIX® GEL FORMICIDA é indicado para o controle de formigas doceiras (*Monomorium floricola* e *Monomorium pharaonis*).

6 – Apresentação / Embalagens: Seringa de plástico 10g.

7 - Precauções:

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.
- Não aplicar em superfícies destinadas ao preparo de alimentos;
- Aplicar apenas em locais inacessíveis a crianças e animais domésticos;
- Não aplique em superfícies recentemente tratadas com inseticida de contato;
- Não aplique o produto em locais que demandam limpeza rotineira;
- Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármores, pois há risco de manchar a superfície.
- Devido a sua formulação e modalidade de uso e, por não ser volátil, não há necessidade de estabelecer intervalo de reentrada após a aplicação deste produto.

8 - EPI´s:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Pirazol
Nome Comum: Fipronil
Antídoto e tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.
Telefone de emergência: (47) 3379 1342 ou 0800 702 5152
Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina: 0800 643 5252

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: **M.S. Nº 3.2057.0075**